

# Melitaea didyma

 Méliée orangée

 Spotted fritillary

Esper (1778)

Famille : Nymphalidae

Sous-famille : Melitaeinae



FR - EUR : Préoccupation mineure.




## Distribution

Présent en Afrique du Nord, de l'Europe centrale et méridionale jusqu'à l'ouest de la Chine. En régression dans le nord de son domaine de répartition. Absente du Royaume-Uni et du nord de l'Europe. Disparue du Luxembourg.

## Description

Grande variabilité de formes de l'espèce. Reconnaisable grâce aux deux bandes rouge orangé qui ornent le verso de ses ailes postérieures blanches.

La couleur du recto des ailes du mâle est rouge fauve, alors qu'elle est plus claire chez la femelle.



## Habitat

Prairies maigres et pelouses sèches.


**PH** : plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*), épiaire droite (*Stachys recta*), centauree scabieuse (*Centaurea scabiosa*), linaria commune (*Linaria vulgaris*), linaria rampante (*L. repens*), véronique germandrée (*Veronica teucrium*), rhinanthé à feuilles étroites (*Rhinantus angustifolius*), rhinanthé des glaciers (*R. glacialis*), molène noire (*Verbascum nigrum*), digitale pourpre (*Digitalis purpurea*).

## Biologie

**Vol** : bivoltin d'avril à septembre.

**Ponte** : oeufs pondus en petits paquets sur le dessous des feuilles de la plante hôte.

**Chrysalide** : sur les plantes.



## Biblio

Guide des papillons d'EUR et d'AFN - Tom Tolman & Richard Lewington - 1999 - Delachaux & Niestlé

Les papillons de jour de Fr, BE, LU - Tristan Lafranchis - 2000 - Parthénope

Liste rouge des espèces menacées en France - Mars 2012 - UICN & MNHN

© Johann Cousinard 2014