

JCO PHOTOGRAPHIES

Prospection papillons à Lesbos

Date Avril 2015
Lieu Lesbos (Grèce)

Quelles espèces rencontrer à Lesbos?

Lors d'un voyage ornitho de groupe sur l'île grecque de Lesbos, je me réserve quelques moments pour faire un peu de prospection papillons (rhopalocères).

Peu de données ont été trouvées avant de partir. Après consultation de divers guides, il semblerait qu'environ 80 espèces soient présentes ou aient déjà été aperçues au moins une fois sur l'île au cours des douze mois que compte une année. A priori, une cinquantaine d'entre el-

les seront potentiellement observables pendant la période de notre séjour (fin avril à début mai). Certaines se rencontrent en France, d'autres sont plus spécifiques à la région des Balkans.

Quelques espèces retiennent particulièrement mon attention, et j'espère avoir la chance de les voir : l'alexanor, le thais balkanique, le faux-apollo, les marbrés de Fabricius et oriental, le citron farineux (même si les chances de l'apercevoir sont relativement



faibles), la mélitée égéenne, la mélitée du bouillon-blanc, et le myrtil de Lesbos qui n'est présent en Europe qu'à Lesbos.

A la recherche des papillons de Lesbos

Premier constat : peu de papillons sont aperçus en vol lors des déplacements en voiture—pas même des piérides blanches sur les bords de route, ce qui n'est pas très encourageant. Pourtant le soleil et la chaleur sont au

rendez-vous. Les papillons rencontrés n'ont jamais été vu en grand nombre sur un même site.

Côté papilionidés, pas d'observation d'alexanor malheureusement, mais les thais bal-

caniques sont au rendez-vous du côté d'Agia Paraskevi et d'Antissa. Ils sont plutôt actifs sous les rayons du soleil, mais dès que le ciel se voile ils se posent au sol immédiatement. Un faux-apollo est identifié dans les oliveraies à proximité de Filia. Des machaons et des flambés sont vus à plusieurs endroits (Skala Kallonis, Limonos, Ipsilou, Petra notamment).

Du côté des piérides, je n'ai pas eu le temps d'aller prospecter vers l'aéroport de Mytilène pour le citron farineux. Par contre le marbré de Fabricius et le marbré oriental ont été vus (Perama), ainsi que plusieurs piérides blanches communes dont l'aurore (Filia).



Un thais balkanique rencontré près du sanatorium d'Agia Paraskevi

Peu de lycènes observés, si ce n'est le cuivré commun, l'azuré commun, l'azuré des nerpruns (ponte à Perama) et le collier de corail. Bilan vraiment décevant pour cette famille.

Côté nymphéidés : pas de mélitée égéenne aperçue non plus. Par contre la mélitée du bouillon-blanc se laisse approcher sur différents sites, et

notamment sur l'hippodrome des salines de Skala Kallonis et au monastère d'Ipsilou. Un magnifique sylvain azuré et une belle-dame naine sont vus dans le secteur d'Agia Paraskevi.

Satyridés : 4 espèces observées seulement - des procris, des némusiens, des mégères et le fameux myrtil de Lesbos que l'on ne rencontre que sur

l'île et en Turquie.

Côté hespéridés. A noter les observations de deux hespéries présentes dans les Balkans : l'hespérie orientale et l'hespérie levantine dans le secteur de Parakila.

Ce qui représente donc un total de 28 espèces aperçues pendant le séjour.



A gauche une mélitée du bouillon-blanc. A droite le myrtil de Lesbos.

Liste des papillons observés

PAP	Machaon - Swallowtail (<i>Papilio machaon</i>)
	Flambé - Scarce swallowtail (<i>Iphiclides podalirius</i>)
	Thaïs balkanique - Eastern festoon (<i>Zeryntha cerisy</i>)
PIE	Faux-apollo - Falso apollo (<i>Archon apollinus</i>)
	Piériide du chou - Large white (<i>Pieris brassicae</i>)
	Piériide de la rave - Small white (<i>Pieris rapae</i>)
	Piériide du navet - Green-veined white (<i>Pieris napi</i>)
	Marbré de Fabricius - Eastern bath white (<i>Pontia edusa</i>)
	Marbré oriental - Eastern dappled white (<i>Euchloe ausonia</i>)
LYC	Aurore - Orange tip (<i>Anthocharis cardamines</i>)
	Souci - Clouded yellow (<i>Colias croceus</i>)
	Cuivré commun - Small copper (<i>Lycaena phlaeas</i>)
	Collier de corail - Brown argus (<i>Aricia agestis</i>)
	Azuré commun - Common blue (<i>Polyommatus icarus</i>)
NMY	Azuré des nerpruns - Holly blue (<i>Celastrina argiolus</i>)
	Sylvain azuré - Southern white admiral (<i>Azuritis reducta</i>)
	Grande tortue - Large tortoiseshell (<i>Nymphalis polychloros</i>)
	Vulcain - Red admiral (<i>Vanessa atalanta</i>)
	Belle-dame - Painted lady (<i>Vanessa cardui</i>)
	Mélitée du bouillon-blanc - Lesser spotted fritillary (<i>Melitaea trivia</i>)
	Myrtil de Lesbos - Turkish meadow brown (<i>Maniola megalis</i>)
	Procris - Small heath (<i>Coenonympha pamphilus</i>)
	Satyre, mégère - Wall brown (<i>Lasiommata megera</i>)
	Némusien - Large wall brown (<i>Lasiommata maera</i>)
HES	Hespérie de la mauve - Grizzled skipper (<i>Pyrgus malvae</i>)
	Hespérie orientale - Orbed red-underwing skipper (<i>Sipala orbifer</i>)
	Hespérie de l'alcée - Mallow skipper (<i>Carcharodus alceae</i>)
	Hespérie levantine - Oriental marble skipper (<i>Carcharodus orientalis</i>)

Morosphinx - **Hummingbird hawk-moth** (*Macroglossum stellatarum*)

JCO PHOTOGRAPHIES

www.johanncousinard.fr